

Sandoz® Bisoprolol

Fumarate de bisoprolol USP
Comprimés de 5 mg et de 10 mg

Agent antihypertenseur

Le présent texte contient des renseignements importants sur les comprimés de Sandoz Bisoprolol (fumarate de bisoprolol). Sandoz Bisoprolol doit être pris une fois par jour. Il appartient au groupe de médicaments appelés « bêta-bloquants ». Votre médecin peut vous avoir prescrit Sandoz Bisoprolol afin de contrôler l'hypertension (hypertension artérielle). Sandoz Bisoprolol diminue la pression artérielle et aide à réduire le travail du cœur.

Bien lire ce qui suit. Les renseignements ci-dessous ne remplacent pas les conseils du médecin ou du pharmacien. Ces derniers vous ont peut-être donné d'autres directives propres à votre état de santé. Assurez-vous de suivre leurs conseils. Si vous avez des questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

DONNÉES IMPORTANTES QUE VOUS DEVEZ COMMUNIQUER À VOTRE MÉDECIN AVANT DE PRENDRE SANDOZ BISOPROLOL

- Si vous êtes enceinte ou prévoyez l'être.
- Si vous allaitez.
- Tous les problèmes de santé présents ou antérieurs, y compris l'asthme, la bronchite, l'emphysème ou autres pneumopathies; une maladie du cœur, des reins ou du foie; le diabète ou la glande thyroïde hyperactive.
- Si vous visitez plus d'un médecin, assurez-vous que chacun est au courant de tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux qui sont en vente libre, notamment les diurétiques, les remèdes contre le rhume, les décongestionnants nasaux et autres médicaments pour le cœur et la pression artérielle.
- Si vous devez subir une chirurgie, avisez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez Sandoz Bisoprolol.
- Si vous êtes allergique à des substances non médicinales, comme les produits alimentaires, les agents de conservation ou les colorants, qui sont susceptibles d'être ajoutées aux comprimés de Sandoz Bisoprolol (voir **INGRÉDIENTS DE SANDOZ BISOPROLOL**).
- Si vous avez eu des réactions sévères, inhabituelles ou allergiques à tout médicament contenant du bisoprolol, dans le passé.

INGRÉDIENTS DE SANDOZ BISOPROLOL

Fumarate de bisoprolol, cellulose microcristalline, phosphate bi-calcique anhydre, fécule de maïs, dioxyde de silicium colloïdal, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthyl cellulose, polyéthylène-glycol, polysorbate 80 et dioxyde de titane. Les comprimés de 5 mg contiennent également de la laque d'aluminium de FD et C jaune numéro 6 et de la laque d'aluminium de FD et C rouge numéro 40.

POSOLOGIE DE SANDOZ BISOPROLOL

Prendre Sandoz Bisoprolol **précisément** tel que vous l'a indiqué votre médecin. Ne pas manquer une dose ni excéder la dose recommandée, à moins d'avis contraire de votre médecin. Si vous avez des questions supplémentaires sur le mode d'emploi, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

- Sandoz Bisoprolol est pris une fois par jour.
- Sandoz Bisoprolol a peut-être été prescrit avec d'autres médicaments afin de contrôler l'état de santé en question; il est important de prendre ces médicaments selon les directives du médecin.
- Il est important que Sandoz Bisoprolol soit pris tous les jours à la même heure.
- Si une dose est oubliée, contactez votre médecin ou votre pharmacien afin de vous informer de la marche à suivre.
- Les comprimés ne doivent être ni croqués ni écrasés.

EFFETS SECONDAIRES

Sandoz Bisoprolol, comme tout médicament, peut causer des effets secondaires. Il est important d'informer votre médecin de tous les effets secondaires, notamment si l'un de ces derniers persiste pendant plusieurs jours. Les effets secondaires les plus communs, qu'ils soient attribuables ou non à Sandoz Bisoprolol, sont les suivants: mal de tête, fatigue, infection urinaire, rhinite ou sinusite (inflammation du nez), diarrhée, étourdissements, œdème périphérique (enflure des chevilles), douleur articulaire, toux, insomnie (trouble du sommeil), nausée (impression d'avoir envie de vomir) et mal de gorge. Consultez immédiatement un médecin si une réaction allergique se présente, accompagnée de symptômes

comme une éruption cutanée, des démangeaisons, de l'enflure, des étourdissements ou des difficultés respiratoires.

La prise de médicaments affecte les patients de différentes façons. Les effets secondaires sont ressentis différemment d'une personne à une autre. Discutez des effets de Sandoz Bisoprolol avec votre médecin ou votre pharmacien. **Ne pas cesser ou reprendre Sandoz Bisoprolol de votre propre gré.**

MISES EN GARDE

- Conserver Sandoz Bisoprolol hors de vue et de portée des enfants.
- Ne pas administrer Sandoz Bisoprolol à d'autres patients, car il ne leur convient peut-être pas.
- Lire attentivement l'étiquette d'ordonnance. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions.

ENTREPOSAGE

Conserver ce médicament entre 15 et 30 °C.

® Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

 **SANDOZ**
Sandoz Canada Inc.
QC, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com
 **1 800 361-3062**

Révisé : 9 décembre 2008
1007111 vi