

**PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR**

**Sandoz® Cefprozil**  
Comprimés de cefprozil



Le présent feuillet constitue la troisième et dernière partie de la monographie publiée à la suite de l'approbation de la vente au Canada de Sandoz Cefprozil et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Ce feuillet n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de Sandoz Cefprozil. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

**EFFETS SECONDAIRES ET PROCÉDURES À SUIVRE**

En plus de l'effet escompté, tout médicament, y compris le cefprozil, peut provoquer des réactions défavorables. Informez votre médecin si un de ces symptômes est grave ou s'il persiste :

- Estomac irrité, diarrhée, vomissements, douleur à l'estomac, étourdissements.

**EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES : FRÉQUENCE ET DIRECTIVES**

Symptôme/effet	Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et appelez votre médecin ou votre pharmacien immédiatement
	Seulement pour les effets indésirables graves	Dans tous les cas	
<b>Fréquent</b> Gastro-intestinal (estomac irrité, diarrhée, vomissements, douleur à l'estomac, étourdissements)		✓	
<b>Rare</b> Éruption cutanée grave, démangeaisons, urticaire Difficulté à respirer ou à avaler Respiration sifflante Jaunissement de la peau et des yeux Plaies douloureuses dans la bouche ou dans la gorge Pertes et démangeaisons vaginales Érythème fessier du nourrisson		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓

Cette liste d'effets indésirables n'est pas exhaustive. En cas d'effet inattendu pendant un traitement avec Sandoz Cefprozil, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Les comprimés Sandoz Cefprozil devraient être conservés entre 15 et 30 °C. Protéger de la lumière et de l'humidité excessive. Garder hors de portée des enfants.

**DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS**

Pour surveiller l'innocuité des médicaments, Santé Canada recueille des renseignements sur les effets graves et inattendus des médicaments. Si vous croyez avoir eu une réaction grave ou inattendue à ce médicament, vous pouvez en faire mention à Santé Canada :

**par téléphone (sans frais) :** 1-866-234-2345

**par télécopieur (sans frais) :** 1-866-678-6789

**par courriel :** cadmp@hc-sc.gc.ca

**par la poste :** Centre national des EI  
Division de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés  
Direction des produits de santé commercialisés  
Pré Tunney, IA : 0701C  
Ottawa (ON) K1A 0K9

**REMARQUE :** Avant de communiquer avec Santé Canada, vous devriez parler avec votre médecin ou votre pharmacien.

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Pour obtenir une copie de ce document et la monographie complète de produit rédigée pour les professionnels de la santé, contactez : Sandoz Canada Inc., au 1-800-361-3062

ou faites une demande écrite à l'adresse suivante : 145, Jules-Léger, Boucherville (QC) Canada J4B 7K8

ou par courriel à : medinfo@sandoz.com

Ce feuillet a été préparé par Sandoz Canada Inc.

© Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.



Sandoz Canada Inc.  
Qc, Canada J4B 7K8  
medinfo@sandoz.com

**?** 1 800 361-3062

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**

**Les raisons d'utiliser ce médicament :**

Sandoz Cefprozil est indiqué pour traiter les infections des voies respiratoires supérieures comme les infections à la gorge, les infections des sinus, les infections non compliquées de la peau et de ses structures ainsi que les infections non compliquées des voies urinaires.

**Les effets de ce médicament :**

Sandoz Cefprozil (cefprozil) est utilisé pour détruire les bactéries ou « microbes » présents dans votre corps, qui causent des infections.

**Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :**

Si vous avez une hypersensibilité à Sandoz Cefprozil (cefprozil), aux antibiotiques de la classe des céphalosporines, à un des ingrédients de sa formulation ou à un des composants de son contenant. Voir **Les ingrédients non médicinaux importants** sont : ci-dessous.

**L'ingrédient médicinaux est :**

Cefprozil

**Les ingrédients non médicinaux importants sont :**

Sandoz Cefprozil en comprimés contient également : méthylcellulose, hypromellose, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, polyéthylène-glycol, polysorbate 80, glycolate d'amidon sodique, dioxyde de titane. Les comprimés de 500 mg contiennent également de l'oxyde ferrique jaune.

**Les formes posologiques sont :**

Sandoz Cefprozil est disponible en bouteilles de 100 comprimés de 250 mg et de 500 mg.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

AVANT de prendre Sandoz Cefprozil dites à votre médecin ou à votre pharmacien si :

- Vous avez déjà eu une réaction allergique grave au cefprozil, aux céphalosporines, aux pénicillines ou à d'autres médicaments.
- Vous prenez tout autre médicament sous ordonnance ou en vente libre, des vitamines, des suppléments alimentaires et des produits naturels. Assurez-vous de dire à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants « médicaments pour éclaircir le sang », des diurétiques « médicaments pour éliminer l'eau », d'autres antibiotiques, et du probénécide (Benemid). Votre médecin devra peut-être modifier la dose de vos médicaments et vous surveiller attentivement pour tout signe d'effets secondaires.
- Vous avez ou vous avez eu une maladie des reins, une phénylcétonurie, une colite ou des problèmes d'estomac.
- Vous êtes enceinte, vous prévoyez tomber enceinte ou vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du cefprozil, communiquer avec votre médecin.

**INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT**

Les médicaments qui peuvent interagir avec Sandoz Cefprozil sont : les antibiotiques aminoglycosides (ex. : probénécide).

**UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT**

**Dose habituelle :**

Le cefprozil, sous forme de comprimé, doit être pris par la bouche. On doit habituellement le prendre aux 24 heures (1 fois par jour) ou aux 12 heures (2 fois par jour) pendant 10 jours. Afin de ne pas oublier de prendre votre médicament, prenez-le à la même heure chaque jour.

Suivez attentivement les indications qui se trouvent sur l'étiquette de votre prescription, et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Prenez le cefprozil tel qu'il est indiqué. N'en prenez pas plus, n'en prenez pas moins et n'en prenez pas plus souvent que ce que votre médecin vous a prescrit. Les comprimés doivent être avalés entiers avec un plein verre d'eau.

Terminez la quantité totale de cefprozil comme prescrit, même si vous vous sentez mieux. L'arrêt prématuré du cefprozil peut faire en sorte que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques.

**Surdosage :**

En cas de surdosage, communiquer avec votre médecin immédiatement afin de recevoir rapidement des soins médicaux.

**Dose oubliée :**

Si vous oubliez de prendre une dose de ce médicament, prenez-la aussitôt que possible. Cela aidera à maintenir une quantité constante de médicament dans votre sang. Cependant, s'il est presque l'heure de votre prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée, revenez plutôt à votre horaire régulier. Ne prenez pas deux doses à la fois.