

Sandoz Diclofénac rapideComprimés de diclofénac potassique
50 mg

Votre médecin a décidé de vous prescrire Sandoz Diclofénac rapide (diclofénac potassique) pour traiter votre problème. Voici des renseignements importants que vous devriez connaître au sujet de Sandoz Diclofénac rapide afin de l'utiliser en toute sécurité et de profiter au maximum de ses bienfaits.

Sandoz Diclofénac rapide appartient à la classe des médicaments connus sous le nom d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). L'ibuprofène et l'aspirine (AAS) appartiennent également à cette classe. Les AINS soulagent la douleur, l'inflammation et la fièvre. Sandoz Diclofénac rapide agit vite pour soulager la douleur et l'enflure dues aux entorses de la cheville, à l'extraction dentaire et aux douleurs menstruelles (dysménorrhée). Les AINS ne guérissent pas l'arthrite : ils ont pour fonction d'atténuer l'inflammation et les effets néfastes de cette dernière sur les tissus. Votre médicament ne prodiguera ses bienfaits que si vous continuez à le prendre.

Vous devriez prendre Sandoz Diclofénac rapide conformément aux instructions de votre médecin. Tenez-vous en à la quantité, à la fréquence et à la durée de traitement prescrites par votre médecin. Si vous prenez ce type de médicament en trop grande quantité, vous vous exposez à un risque plus grand d'effets indésirables, surtout si vous êtes âgé.

Les troubles gastriques comptent parmi les problèmes les plus courants associés aux AINS :

Pour atténuer ces troubles, prenez votre médicament immédiatement après un repas ou encore avec des aliments ou du lait. De plus, vous devriez rester debout ou assis bien droit (en d'autres termes, ne vous étendez pas) au cours des 15 à 30 minutes suivant l'ingestion du médicament. Vous contribuerez ainsi à prévenir l'irritation pouvant conduire à des problèmes de déglutition (difficulté à avaler). En cas de troubles gastriques persistants (indigestion, nausées, vomissements, douleurs gastriques ou diarrhée), communiquez avec votre médecin.

Prendre Sandoz Diclofénac rapide en toute sécurité : Quels renseignements devez-vous fournir à votre médecin, pharmacien ou dentiste?

Afin d'évaluer si vous pouvez prendre Sandoz Diclofénac rapide en toute sécurité, votre médecin doit obtenir certains renseignements sur votre état de santé. Avant de commencer à prendre Sandoz Diclofénac rapide, avisez votre médecin si vous :

- ou un membre de votre famille êtes allergique ou avez déjà eu une réaction allergique à Sandoz Diclofénac rapide (diclofénac potassique) ou à un autre anti-inflammatoire (par exemple, acide acétylsalicylique [AAS], diflunisal, fénoprophène, flurbiprofène, ibuprofène, indométhacine, kétoprofène, acide ménémanique, piroxicam, acide tiaprofénique, tolmétine, nabumétone ou ténoxicam), laquelle s'est manifestée par l'aggravation d'une sinusite, de l'urticaire, l'apparition d'asthme ou l'intensification d'un asthme existant, ou une anaphylaxie (choc);
- ou un membre de votre famille avez déjà souffert d'asthme, de polypes nasaux, de sinusite chronique ou d'urticaire chronique;
- avez eu des réactions indésirables après avoir pris des médicaments contre l'arthrite, les rhumatismes ou la douleur articulaire;
- avez des antécédents de troubles gastriques ou d'ulcère;
- souffrez d'une maladie du foie;
- souffrez d'une maladie des reins;
- êtes aux prises avec des anomalies touchant le sang ou l'urine;
- présentez de l'hypertension artérielle;
- êtes diabétique;
- suivez un régime particulier (hyposodique, hypoglycémique, etc.);
- prenez un autre médicament (d'ordonnance ou en vente libre), par exemple : AINS, agent contre l'hypertension artérielle, médicament visant à éclaircir le sang, corticostéroïde, méthotrexate, cyclosporine, lithium ou phénytoïne;
- souffrez d'une autre maladie (alcoolisme, saignements, etc.).

Pendant votre traitement :

Si vous consultez un autre médecin ou un dentiste et que vous prenez Sandoz Diclofénac rapide, n'oubliez pas de le lui dire.

Sandoz Diclofénac rapide peut entraîner de la somnolence, des étourdissements et des vertiges.

Si ces symptômes se manifestent, gardez-vous de conduire et de vous livrer à toute autre activité nécessitant de l'attention.

Signalez toute réaction indésirable à votre médecin. Vous devez lui en parler, car vous l'aidez ainsi à déceler sans tarder et à prévenir d'éventuelles complications.

Vous serez plus susceptible d'éprouver des troubles gastriques si vous prenez des boissons alcoolisées. Veuillez donc vous abstenir d'en consommer pendant votre traitement.

Communiquez immédiatement avec votre médecin si, au cours de votre traitement, vous ressentez une faiblesse inhabituelle, vous vomissez du sang, ou vous constatez que vos selles sont noirâtres ou sanguinolentes.

Le traitement peut avoir pour effet de sensibiliser davantage certaines personnes au rayonnement solaire. Le cas échéant, l'exposition, même brève, à la lumière du soleil ou à une lampe à rayons ultraviolets peut provoquer un coup de soleil, l'apparition de cloques sur la peau, une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, une décoloration de la peau ou des troubles de la vision. Si vous subissez une de ces réactions, parlez-en à votre médecin.

Consultez immédiatement votre médecin si vous êtes aux prises avec des frissons, de la fièvre, des douleurs musculaires ou d'autres symptômes pseudo-grippaux, surtout si ceux-ci se manifestent juste avant une éruption cutanée, ou accompagnent une réaction de cette nature. Il peut s'agir, quoique très rarement, des premiers signes d'une réaction grave au médicament.

Il est essentiel que vous subissiez régulièrement un examen médical.

Si vous êtes enceinte ou si vous avez l'intention de le devenir, informez-en votre médecin. Il n'est généralement pas recommandé de prendre Sandoz Diclofénac rapide pendant la grossesse, plus particulièrement

durant les trois derniers mois. Il en est de même si vous allaitez parce que Sandoz Diclofénac rapide passe dans le lait maternel. Si vous avez besoin de Sandoz Diclofénac, votre médecin jugera quelle dose vous avez besoin.

Quels sont les effets secondaires?

Tout comme les autres médicaments, Sandoz Diclofénac rapide peut entraîner des effets secondaires. Il est bon de les connaître, surtout si vous êtes une personne âgée. Les effets indésirables sont souvent plus fréquents ou plus graves chez les personnes âgées, frêles ou affaiblies.

Certains effets secondaires peuvent ne causer qu'un léger malaise mais il est important de les signaler à votre médecin. Avisez-le dès que possible si vous éprouvez l'un des effets ci-dessous. Bien qu'ils ne soient pas tous fréquents, ils peuvent nécessiter l'intervention d'un médecin :

- selles sanguinolentes ou noires;
- douleurs d'estomac, nausées, vomissements, indigestion, diarrhée, démangeaison rectale ou saignements;
- coloration jaunâtre de la peau ou des yeux;
- symptômes évoquant une grippe;
- sensibilité sous les côtes, du côté droit;
- démangeaisons, éruption cutanée, urticaire, gonflement;
- essoufflement, sifflement, troubles respiratoires ou oppression de la poitrine;
- enflure des pieds ou du bas des jambes;
- vue brouillée ou tout autre trouble de la vue ou de l'ouïe;
- changements dans la quantité ou la couleur de l'urine (foncée, rouge ou brune);
- confusion mentale, dépression, maux de tête, étourdissements, sensation de tête légère;
- douleur ou difficulté lors de la miction;
- malaise, fatigue, perte de l'appétit.

D'autres effets secondaires peuvent aussi se faire sentir chez certains patients. Si vous ressentez des effets non mentionnés ci-dessus, parlez-en à votre médecin.

Peut-on prendre d'autres médicaments en même temps?

À moins d'un avis contraire de votre médecin, il ne faut pas prendre de médicaments pour soulager la douleur ou l'enflure, comme l'aspirine (AAS), les composés renfermant de l'AAS ou des médicaments comme l'ibuprofène, quand on prend Sandoz Diclofénac rapide. Si vous prenez d'autres médicaments, n'oubliez pas d'en aviser votre médecin.

Avez-vous obtenu les bons comprimés?

Les comprimés Sandoz Diclofénac rapide à 50 mg sont ronds et brun rougeâtre, imprimés «S» d'un côté et «RAPIDE 50» de l'autre, en encra blanche.

Comment prendre Sandoz Diclofénac rapide?

La dose habituelle est de un comprimé deux ou trois fois par jour à prendre avec de la nourriture. La dose quotidienne totale ne devrait pas dépasser trois comprimés. Dans le cas de dysménorrhée, cependant, il se peut que votre médecin vous prescrive deux comprimés comme première dose. Dans ce cas, vous prendrez quatre comprimés le premier jour. Prenez toujours la dose exacte prescrite : pas plus, pas moins, et pas plus souvent.

Si vous prenez ce type de médicaments en trop grande quantité, vous vous exposez à un risque plus grand d'effets indésirables, surtout si vous êtes âgé.

Conservation :

Protégez les comprimés de la chaleur (conserver à une température inférieure à 30 °C) et de l'humidité.

À NE JAMAIS OUBLIER :

VOTRE MÉDECIN VOUS A PRESCRIT SANDOZ DICLOFÉNAC RAPIDE APRÈS UN EXAMEN MINUTIEUX DE VOS SYMPTÔMES. PRENEZ LE MÉDICAMENT TEL QU'IL EST PRESCRIT ET NE LE DONNEZ JAMAIS À QUELQU'UN D'AUTRE. POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN. GARDEZ CE MÉDICAMENT (COMME TOUS LES AUTRES) HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. SI VOUS PENSEZ ÉPROUVER DES EFFETS SECONDAIRES, ARRÊTEZ DE PRENDRE LES COMPRIMÉS ET AVERTISSEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

L'EMPLOI DE SANDOZ DICLOFÉNAC RAPIDE N'EST PAS RECOMMANDÉ CHEZ LES PATIENTS DE MOINS DE 16 ANS, CAR L'INNOCUITÉ ET L'EFFICACITÉ DU MÉDICAMENT N'ONT PAS ÉTÉ ÉTABLIES AU SEIN DE CETTE POPULATION. COMME TOUT AUTRE MÉDICAMENT, SANDOZ DICLOFÉNAC RAPIDE DOIT ÊTRE GARDÉ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

IL FAUT SOUPEUSER LES RISQUES ET LES BIENFAITS DU PRÉSENT TRAITEMENT.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR SANDOZ DICLOFÉNAC RAPIDE, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

NE CONSERVEZ PAS UN MÉDICAMENT PASSÉ SA DATE DE PÉREMPTION.



Sandoz Canada Inc.
Qc, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com

1 800 361-3062

Révisé : avril 2006