

Sandoz® Felodipine



Féلودipine

Comprimés de 5 mg et de 10 mg

Le présent feuillet constitue la troisième et dernière partie d'une monographie de produit publiée à la suite de l'approbation de la vente au Canada de Sandoz Felodipine et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Ce feuillet n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de Sandoz Felodipine. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Il est important de lire ce feuillet avec attention. Ce feuillet ne remplace pas les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien puisqu'ils peuvent vous avoir donné des directives différentes en fonction des conditions particulières de votre santé. Assurez-vous de bien suivre leurs conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous informer auprès de votre médecin ou de votre pharmacien. **Surtout, ne décidez pas vous-même de la façon de prendre Sandoz Felodipine.**

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament :

Sandoz Felodipine est le nom commercial pour la féلودipine, un médicament appartenant à la famille des « agents bloqueurs des canaux calciques » ou des « agents antagonistes du calcium » et qui est utilisé dans le traitement de l'hypertension.

Les effets de ce médicament :

Sandoz Felodipine agit principalement comme un relaxant sur les artères, ce qui permet au sang de circuler plus librement et, de ce fait, abaisse la pression artérielle.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Assurez-vous d'avoir informé votre médecin des situations suivantes :

- Vous êtes enceinte ou vous avez l'intention de le devenir.
- Vous allaitez.
- Tous les problèmes médicaux que vous avez présentement ou que vous avez eu dans le passé.
- Tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sans ordonnance. Si vous consultez plus d'un médecin, assurez-vous d'avoir informé chacun d'eux de tous les médicaments que vous prenez.
- Si vous êtes allergique à certains produits non médicinaux tels des aliments, des agents de conservation ou les colorants qui peuvent être présents dans les comprimés (voir **Les ingrédients non médicinaux importants** sont).
- Si vous avez déjà eu une mauvaise réaction, une réaction inhabituelle, ou encore, une réaction allergique à la féلودipine.

L'ingrédient médicamenteux est :

Féلودipine

Les ingrédients non médicinaux importants sont :

La plupart des médicaments contiennent plusieurs composantes en plus de l'ingrédient actif. Ces autres ingrédients sont nécessaires afin de présenter le médicament sous une forme facile à avaler. Vérifiez auprès de votre médecin si vous croyez être allergique à l'une des substances suivantes : le monohydrate de lactose, le laurylsulfate de sodium, l'hydroxypropylméthylcellulose, la cellulose microcristalline, le stéarate de magnésium, le polyéthylène-glycol, le dioxyde de titane, l'oxyde de fer jaune et l'oxyde de fer rouge.

Pour obtenir une liste complète des ingrédients non médicinaux, consultez la partie I de la monographie de produit.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Précautions que vous devriez prendre :

- Gardez Sandoz Felodipine hors de la vue et de la portée des enfants. Ne prenez jamais de médicament à la vue de jeunes enfants afin qu'ils ne vous imitent pas.
- Tous les médicaments inutilisés dont vous n'avez plus besoin devraient être jetés en prenant les précautions d'usage. Vous pouvez demander conseil à votre pharmacien.
- L'emballage utilisé pour Sandoz Felodipine est conçu pour protéger chaque comprimé. Si en ouvrant l'emballage, vous remarquez que la pellicule de plastique ou la feuille d'aluminium est endommagée au point d'exposer un comprimé, demandez à votre pharmacien d'inspecter l'emballage.
- Informez-vous auprès de votre médecin s'il vous est permis de prendre un verre d'alcool, même un verre de vin pendant un repas, lorsque vous êtes sous médication avec Sandoz Felodipine. Il se peut que vous ayez des étourdissements. L'alcool peut causer une baisse inconfortable de votre pression artérielle.

- Souvenez-vous qu'il est possible que vous ne ressentiez aucun symptôme d'hypertension. **Toutefois, il est important de prendre votre médicament même si vous vous sentez bien.** Votre organisme a besoin d'une quantité constante de Sandoz Felodipine pour maîtriser votre pression artérielle. **Ne décidez pas vous-même de cesser l'emploi de ce médicament.**

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT

Sandoz Felodipine interagit avec d'autres médicaments. Vous devez informer votre médecin de toutes les médications que vous prenez. Ceci inclut toutes médications avec ou sans ordonnance ainsi que tous suppléments alimentaires.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Comment prendre Sandoz Felodipine :

Vous devez prendre ce médicament selon les directives spécifiques de votre médecin. Ne manquez aucune dose et ne prenez pas de comprimé supplémentaire à moins que votre médecin vous l'ait indiqué. Si ces directives ne vous semblent pas claires, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

- Sandoz Felodipine se prend une fois par jour. Même si votre médecin vous a prescrit 2 comprimés par jour, ceux-ci devraient être pris en même temps, sauf sur avis contraire.
- Essayez de prendre ce médicament à un moment où vous faites quelque chose de régulier chaque jour, par exemple, au réveil ou au déjeuner. Cela vous aidera à ne pas oublier de dose.
- Vous ne devez pas prendre Sandoz Felodipine avec un repas riche en gras ou en hydrates de carbone. Les aliments au déjeuner qui sont riches en gras et/ou en hydrates de carbone comprennent le bacon, les saucisses, les pommes de terre rissolées et les céréales sucrées. Vous pouvez prendre Sandoz Felodipine avec un repas léger, faible en gras et en hydrates de carbone (par exemple : 2 tranches de pain avec du fromage, des céréales avec du lait et un jus d'orange).
- **Vous devriez éviter de boire du jus de pamplemousse pendant que vous prenez Sandoz Felodipine, car ce jus peut faire augmenter la quantité de Sandoz Felodipine dans votre organisme.**
- Avalez votre comprimé en entier avec un verre d'eau. Il ne faut pas broyer, croquer, briser ou sucer les comprimés.
- Ne transférez pas votre médication dans un autre contenant. Gardez les comprimés dans le contenant original conçu à cette fin.

Dose oubliée :

Si vous avez oublié de prendre une dose de Sandoz Felodipine et que vous vous en apercevez moins de 12 heures plus tard, vous devez la prendre dès que c'est possible. Revenez ensuite à l'horaire habituel. Si vous avez dépassé ce délai de 12 heures, ne prenez pas la dose oubliée. Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle.

Ne doublez jamais une dose de Sandoz Felodipine pour compenser l'oubli d'un comprimé. Si vous êtes incertain, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES

En plus de son effet régulateur sur la pression sanguine, Sandoz Felodipine, comme tout médicament, peut aussi causer des effets secondaires.

Certains de ces effets secondaires peuvent se produire au début du traitement ou à la suite d'une augmentation de la dose. Ces effets secondaires sont habituellement légers et devraient disparaître à mesure que l'organisme s'habitue au médicament.

Il est important de tenir informé votre médecin de tous les effets secondaires, surtout si l'un des symptômes suivants persiste plus d'une semaine :

- Enflure des chevilles
- Rythme cardiaque accéléré
- Rougeur du visage ou sensation de chaleur
- Maux de tête
- Étourdissement
- Fatigue inhabituelle

Les médicaments n'affectent pas tout le monde de la même façon. Si d'autres personnes ont ressenti des effets secondaires, cela ne veut pas dire que vous en aurez aussi. Décrivez à votre médecin et à votre pharmacien comment vous vous sentez lorsque vous prenez Sandoz Felodipine. **Ne cessez pas de prendre vos comprimés sans avoir d'abord consulté votre médecin.**

Quelques patients ont rapporté une légère sensibilité ou une enflure des gencives pendant l'emploi de Sandoz Felodipine. Cet effet peut être évité grâce à une bonne hygiène dentaire. Brossez-vous les dents soigneusement et souvent avec une brosse à dents à poils souples et utilisez la soie dentaire tous les jours.

Un massage régulier des gencives avec votre brosse à dents à poils souples aidera aussi, mais si vos gencives deviennent sensibles, rouges ou enflées, informez-en votre médecin ou votre dentiste.

D'autres effets secondaires ont été rapportés dans quelques cas tels des picotements dans les mains, les bras, les pieds et les jambes; des maux d'estomac; de la diarrhée; le besoin d'uriner fréquemment et des problèmes d'ordre sexuels. Si ces effets vous incommode, parlez-en à votre médecin.

Vous devriez communiquer immédiatement avec votre médecin si vous notez quelque chose d'inhabituel.

Cette liste des effets secondaires n'est pas exhaustive. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise de Sandoz Felodipine, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conservez ce médicament dans un endroit sec, entre 15 et 30 °C et protégez-le de la lumière. Ne gardez pas Sandoz Felodipine dans la salle de bain. **Tenez ce médicament hors de portée des enfants.** Ne prenez plus et ne gardez plus ce médicament une fois que la date indiquée sur le contenant est expirée.

SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS

À l'aide du Programme Canada Vigilance, Santé Canada recueille des renseignements sur les effets secondaires graves et inattendus des médicaments afin de surveiller leur innocuité. Si vous croyez avoir eu une réaction grave ou inattendue au présent médicament, vous pouvez en informer Canada Vigilance :

Téléphone (sans frais) : 1 (866) 234-2345

Télécopieur (sans frais) : 1 (866) 678-6789

Site web : www.santecanada.gc.ca/medeffet

Par courriel : CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca

Par courrier :

Bureau national de Canada Vigilance

Division de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés

Direction des produits de santé commercialisés

Direction générale des produits de santé et des aliments

Santé Canada

Pré Tunney, LA : 0701C

Ottawa (ON) K1A 0K9

REMARQUE : *Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé avant de les déclarer à Canada Vigilance. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.*

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Tous les médicaments peuvent avoir à la fois des effets bénéfiques et des effets nocifs. Ceux-ci varient en fonction de la personne et de la condition de sa santé. Ce feuillet vous mentionne les occasions où vous devriez appeler votre médecin. D'autres symptômes imprévus peuvent survenir. Rien dans ce feuillet ne devrait vous empêcher d'appeler votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes soucieux ou si vous avez des questions concernant Sandoz Felodipine.

S'il vous plaît, prenez le temps de lire ce feuillet avant de commencer à prendre le médicament Sandoz Felodipine. À chaque renouvellement de votre ordonnance, il est aussi essentiel que vous relisiez ces informations au cas où de nouvelles informations auraient été ajoutées. Rappelez-vous que ce feuillet ne remplace en aucune façon les avis et conseils de votre médecin. Vous devriez discuter avec votre médecin de Sandoz Felodipine au début du traitement et aux rendez-vous de contrôle.

Pour obtenir une copie de ce document et la monographie complète de produit, rédigée pour les professionnels de la santé, contactez :

Sandoz Canada Inc., au 1-800-361-3062

ou faites une demande écrite à l'adresse suivante :

145, Jules-Léger, Boucherville (QC) Canada J4B 7K8

ou à : medinfo@sandoz.com

Ce feuillet a été préparé par Sandoz Canada Inc.


© Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

 **SANDOZ**

Sandoz Canada Inc.

QC, Canada J4B 7K8

medinfo@sandoz.com

 **1-800-361-3062**

Dernière révision : 11 mai 2006

1007011 vi