RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

PSandoz® Fluoxétine

Chlorhydrate de fluoxétine
Capsules de 10 mg et de 20 mg

SANDOZ

Antidépresseur

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE MÉDICAMENT SANDOZ FLUOXÉTINE

Veuillez lire ces renseignements avant de commencer à prendre votre médicament, même s'il vous a déjà été prescrit dans le passé. Conservez ce feuillet jusqu'à ce que vous ayez terminé de prendre toutes vos capsules, car il vous faudra peut-être le lire de nouveau. **Pour d'autres renseignements ou des conseils, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.**

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR AU SUJET DE SANDOZ FLUOXÉTINE

- Sandoz Fluoxétine (chlorhydrate de fluoxétine) fait partie d'un groupe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS).
- Sandoz Fluoxétine vous a été prescrit par votre médecin pour soulager vos symptômes de dépression, de boulimie ou de trouble obsessionnel-compulsif.

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE SAVOIR À VOTRE MÉDECIN AVANT DE PRENDRE SANDOZ FLUOXÉTINE

- Tous vos troubles médicaux, y compris tout antécédent de troubles hépatiques ou rénaux, de convulsions ou de perte de connaissance ou de diabète.
- Tout médicament (prescrit ou non) que vous prenez présentement ou avez pris récemment, en particulier tout inhibiteur de la monoamine-oxydase (ex. : sulfate de phénelzine, sulfate de tranylcypromine, moclobémide ou sélégiline), tout autre antidépresseur, tout médicament antidiabétique et tout médicament servant à éclaircir le sang (anticoagulants) ou contenant du tryptophane.
- Si vous êtes enceinte ou songez à le devenir ou si vous allaitez.
- Vos habitudes de consommation d'alcool et, s'il y a lieu, de drogues illicites.
- Si vous avez déjà fait une réaction allergique à un médicament utilisé pour traiter votre état actuel.
- Si vous conduisez un véhicule ou effectuez des tâches dangereuses dans le cadre de votre travail.

COMMENT PRENDRE SANDOZ FLUOXÉTINE

- Il importe de prendre Sandoz Fluoxétine exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Il faut prendre, en général, entre 20 et 80 mg par jour pour traiter la dépression et le trouble obsessionnel-compulsif, et entre 20 et 60 mg par jour pour traiter la boulimie. Votre médecin pourra ajuster la dose au cours de votre traitement.
- N'augmentez jamais la quantité de Sandoz Fluoxétine que vous prenez, à moins que votre médecin vous l'ait recommandé.
- Vous devez continuer à prendre votre médicament même si vous ne sentez pas d'amélioration, car votre médicament peut prendre un certain nombre de semaines avant de commencer à agir. L'amélioration sera graduelle.
- Sandoz Fluoxétine est pris habituellement une fois par jour. On peut le prendre avec des aliments ou non. Si on vous a prescrit des capsules, vous devez les avaler entières, sans les mâcher.
- Continuez à prendre Sandoz Fluoxétine jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter. Vous pourriez devoir le prendre pendant plusieurs mois. Suivez toujours les directives de votre médecin.
- Si vous oubliez une dose de Sandoz Fluoxétine, n'essayez pas d'y remédier en doublant la prochaine dose. Prenez la dose suivante comme prévu.

Attention : Ce médicament a été prescrit spécialement pour vous. Ne le donnez à personne d'autre.

QUAND NE PAS PRENDRE SANDOZ FLUOXÉTINE

- Ne prenez pas Sandoz Fluoxétine si vous êtes allergique à ce médicament ou à l'un de ses constituants (voir la liste des ingrédients de Sandoz Fluoxétine à la fin de cette section). Cessez de prendre le médicament et communiquez immédiatement avec votre médecin si vous avez une réaction allergique (ex. : éruption cutanée, urticaire) ou tout autre effet secondaire grave ou inhabituel.

PRÉCAUTIONS LORS D'UN TRAITEMENT AVEC SANDOZ FLUOXÉTINE

- Vous pourriez avoir des réactions indésirables comme des nausées, des étourdissements, des maux de tête, de l'anxiété, de la nervosité, de la somnolence, de l'insomnie ou des troubles sexuels. Consultez votre médecin si vous avez ces réactions ou d'autres effets secondaires, car il faudra peut-être ajuster la dose.
- Même si Sandoz Fluoxétine entraîne rarement une somnolence de forme grave, vous devriez éviter de conduire une voiture ou de manœuvrer des machines exigeant de la vigilance à moins d'être absolument certain de pouvoir le faire en toute sécurité.

QUE FAIRE EN CAS DE SURDOSAGE

- Si vous avez pris un grand nombre de capsules à la fois, communiquez immédiatement avec votre médecin ou le service d'urgence de l'hôpital le plus près, même si vous ne vous sentez pas mal. Montrez au médecin le flacon de votre médicament.

COMMENT CONSERVER SANDOZ FLUOXÉTINE

- Gardez votre médicament hors de la portée des enfants.
- Conservez-le dans son contenant d'origine à la température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri des rayons directs du soleil.
- N'utilisez pas le médicament après la date de péremption imprimée sur l'étiquette du contenant.

COMPOSITION DE SANDOZ FLUOXÉTINE

- Les capsules de Sandoz Fluoxétine contiennent comme ingrédient actif du chlorhydrate de fluoxétine.
- Les capsules de Sandoz Fluoxétine renferment les ingrédients inactifs suivants : amidon prégélatinisé, diméthicone 350. La tunique de la capsule contient de l'indigo carmine (AD & C Bleu nº 2), du jaune de quinoline (D&C Jaune nº 10), du dioxide de titanium, de la gélatine et de l'oxyde de fer jaune et noir.

® Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

SANDOZ
Sandoz Canada Inc.
Qc, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com
? 1 800 361-3062

Révisé : mars 2006