

Sandoz® PravastatinComprimés de pravastatine sodique
10 mg, 20 mg et 40 mg**Régulateur du métabolisme lipidique**

Le médecin et le pharmacien peuvent obtenir la monographie du produit sur demande.

Sandoz Pravastatin est le nom de marque déposée de la pravastatine sodique de Sandoz Canada Inc.

Sandoz Pravastatin diminue les taux sanguins de cholestérol et particulièrement ceux du cholestérol lié aux lipoprotéines de basse densité (LDL). Sandoz Pravastatin réduit la production hépatique de cholestérol et produit certaines modifications dans le transport et la répartition du cholestérol dans le sang et les tissus.

Vous ne pouvez vous procurer Sandoz Pravastatin que sur ordonnance. Ce médicament est un adjuvant thérapeutique au régime alimentaire que votre médecin vous a recommandé et qu'il surveille attentivement, régime visant le traitement prolongé de l'hypercholestérolémie ; il ne peut aucunement remplacer ce régime. Ce médicament a montré qu'il diminue le risque de subir une première ou une deuxième crise cardiaque ou apoplexie, et peut aider à prévenir la cardiopathie si elle est causée par l'obstruction des vaisseaux sanguins par le cholestérol ou à ralentir l'évolution de l'athérosclérose (durcissement) des artères qui irriguent le cœur, c.-à-d. la coronaropathie. Par ailleurs, selon votre état, votre médecin peut vous recommander un programme approprié d'exercices et de perte de poids, ainsi que d'autres mesures.

Utilisez ce produit seulement selon le mode d'emploi prescrit. Ne modifiez pas sa posologie, sauf sur recommandation du médecin. Consultez votre médecin avant d'interrompre la prise de ce médicament pour éviter le risque d'augmentation des taux de lipides dans le sang.

Avant de prendre ce médicament, vous devez prévenir votre médecin si :

- vous avez déjà pris Sandoz Pravastatin ou un autre hypolipidémiant de la même classe [ex. : fluvastatine (Lescol), lovastatine (Mevacor), simvastatine (Zocor), atorvastatine (Lipitor) ou cêrivastatine] et si l'agent a entraîné une allergie ou une intolérance ;
- vous souffrez d'une maladie du foie ;
- vous êtes enceinte, vous avez l'intention de le devenir, vous allaitez ou vous avez l'intention de le faire ;
- vous prenez d'autres médicaments, particulièrement des corticostéroïdes, de la cyclosporine (Neoral, Sandimmune), du gemfibrozil (Lopid), des anticoagulants (ex. : warfarine), de l'érythromycine ou de la digoxine.

USAGE APPROPRIÉ

- Sandoz Pravastatin devrait être pris en une seule fois au coucher, tel que votre médecin vous l'a prescrit.
- Votre médecin surveillera à des intervalles réguliers votre état clinique et les résultats des prises de sang. Il est important de vous soumettre à ces examens au moment prévu. Veuillez donc respecter vos rendez-vous.
- Évitez la consommation excessive d'alcool.
- Signalez à votre médecin toute maladie qui pourrait apparaître au cours de votre traitement avec Sandoz Pravastatin ainsi que le nom de tous les médicaments d'ordonnance ou en vente libre que vous prenez. Si vous avez besoin de consulter un autre médecin pour une quelconque raison, veuillez le prévenir que vous prenez Sandoz Pravastatin.
- Prévenez votre médecin si vous devez vous soumettre à une intervention chirurgicale importante ou si vous avez été victime d'un accident grave.
- Signalez à votre médecin toute douleur, sensibilité ou faiblesse musculaires qui pourraient se manifester au cours du traitement avec Sandoz Pravastatin (voir **EFFETS SECONDAIRES**).
- L'innocuité de Sandoz Pravastatin chez les adolescents et les enfants n'a pas été établie.
- Sandoz Pravastatin est contre-indiqué pendant la grossesse étant donné que le produit pourrait

nuire au fœtus. Il ne sera administré aux femmes en âge de procréer que si l'éventualité d'une grossesse est très faible. Dans le cas où la grossesse survient pendant le traitement avec Sandoz Pravastatin, on devrait en interrompre l'administration et avertir le médecin.

EFFETS SECONDAIRES

En dehors des effets visés, tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires indésirables.

Consultez votre médecin le plus rapidement possible si l'un des effets secondaires suivants se manifeste : douleurs musculaires, crampes musculaires, fatigue ou faiblesse, fièvre et vision trouble.

D'autres effets secondaires peuvent parfois se produire sans que cela impose l'arrêt du traitement. Ces effets peuvent apparaître et disparaître au cours du traitement sans qu'ils représentent un danger particulier. Cependant, vous devriez les mentionner au médecin sans trop tarder, s'ils deviennent persistants ou ennuyeux. Il s'agit de douleurs abdominales, constipation, diarrhée, nausées, céphalées, vertiges et éruptions cutanées.

Ce médicament vous a été expressément prescrit pour traiter votre affection et pour votre seul usage. N'en donnez pas à d'autres personnes.

Gardez tous les médicaments hors de la portée des enfants.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

© Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

Sandoz Canada Inc.
Qc, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com

1 800 361-3062

Révisé : mars 2006