

Sandoz® Sertraline

Chlorhydrate de sertraline

Capsules de 25 mg, 50 mg et 100 mg

**Antidépresseur**

Veillez lire ce qui suit avant de prendre votre médicament, même si ce n'est pas la première fois qu'on vous le prescrit.

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR AU SUJET DE SANDOZ SERTRALINE

Sandoz Sertraline (chlorhydrate de sertraline) appartient à une classe de médicaments appelés ISRS ou Inhibiteurs Sélectifs du Recaptage de la Sérotonine.

Il vous a été prescrit par votre médecin pour soulager vos symptômes de dépression. **Le traitement avec ce type de médicaments est plus sûr et plus efficace lorsqu'on communique ouvertement avec son médecin et qu'on lui fait part de ce qu'on ressent.**

CE QUE VOUS DEVRIEZ COMMUNIQUER À VOTRE MÉDECIN AVANT DE PRENDRE SANDOZ SERTRALINE

- Toutes les maladies dont vous souffrez; dites-lui également si vous avez déjà eu des crises d'épilepsie ou une maladie du foie ou des reins.
- Tous les médicaments (d'ordonnance ou en vente libre) que vous prenez présentement, en particulier, les antidépresseurs, surtout ceux de la classe des inhibiteurs de la monoamine oxydase (sulfate de phénelzine ou de tranylcypromine, moclobémide, etc.), ou les autres antidépresseurs, le pimozide (un antipsychotique), les médicaments prescrits pour le diabète ou pour éclaircir le sang (anticoagulants) et les médicaments contenant du tryptophane.
- Si vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir, ou si vous allaitez.
- Vos habitudes en matière de consommation d'alcool.
- Si vous prenez des produits naturels ou des plantes médicinales (ex. : du millepertuis).

COMMENT PRENDRE SANDOZ SERTRALINE

- Il est très important que vous suiviez à la lettre les directives de votre médecin lorsque vous prenez Sandoz Sertraline. La dose de départ habituelle pour le traitement de la dépression et du trouble obsessionnel-compulsif est de 50 mg par jour. Si vous prenez Sandoz Sertraline pour le traitement du trouble panique, il se peut que votre médecin vous fasse commencer par une dose de 25 mg par jour.
- Au cours du traitement, votre médecin peut également augmenter la dose s'il le juge nécessaire; celle-ci pourrait atteindre 200 mg par jour.
- Vous ou la personne à qui vous dispensez des soins, si vous êtes un fournisseur de soins ou un tuteur, ne devez jamais augmenter ou réduire la dose de Sandoz Sertraline sans que votre médecin vous l'ait conseillé; n'arrêtez jamais de prendre ce médicament sans consulter votre médecin. (Voir **PRÉCAUTIONS À PRENDRE DURANT LA THÉRAPIE AVEC SANDOZ SERTRALINE**)
- Vous devriez continuer à prendre votre médicament même si vous ne sentez aucune amélioration, car Sandoz Sertraline peut prendre environ quatre semaines avant d'agir.
- Vous devriez prendre Sandoz Sertraline avec de la nourriture, le matin ou le soir. Vous devriez avaler la capsule en entier; ne la mâchez pas.
- Continuez à prendre Sandoz Sertraline jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter. Il se peut que votre médecin vous fasse prendre Sandoz Sertraline pendant plusieurs mois. Suivez ses directives.
- Si vous omettez une dose, ne vous en faites pas; vous n'avez qu'à prendre la prochaine, à l'heure habituelle; ne prenez pas deux doses à la fois. Par contre, si vous omettez plusieurs doses, il est important que vous consultiez votre médecin.
- Si vous prenez Sandoz Sertraline, vous devriez éviter de prendre du millepertuis.

QUAND NE PAS PRENDRE SANDOZ SERTRALINE

Ne prenez pas Sandoz Sertraline si vous êtes allergique à ce produit ou à n'importe quelle substance qui entre dans sa composition (voir **CE QUE CONTIENT SANDOZ SERTRALINE**). Cessez de prendre Sandoz Sertraline et contactez votre médecin sans tarder si vous avez une réaction allergique ou des effets indésirables graves ou inhabituels.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE DURANT LA THÉRAPIE AVEC SANDOZ SERTRALINE

- Il se peut que vous éprouviez certains effets secondaires comme des nausées, des maux de tête, une sécheresse de la bouche, de la diarrhée, des troubles du sommeil ou une perte d'appétit. Vous pourriez aussi éprouver de la somnolence, des difficultés d'ordre sexuel, de la nervosité ou des tremblements. Consultez votre médecin si cela vous arrive ou si vous avez d'autres effets secondaires, car il se peut qu'on doive modifier la dose.
- **Chez un faible pourcentage de patients traités avec ce genre de médicaments, il arrive que l'état s'aggrave au lieu de s'améliorer, surtout pendant les premières semaines du traitement ou lorsque la dose est modifiée. Les patients peuvent, par exemple, contrairement à leur habitude, se sentir agités, hostiles ou anxieux, ou avoir des pensées impulsives ou troublantes, par exemple vouloir se faire du tort ou en faire à autrui. Si cela vous arrivait à vous ou à la personne à qui vous dispensez des soins, si vous êtes un fournisseur de soins ou un tuteur, consultez votre médecin sans attendre; ne**

décidez pas par vous-même de cesser de prendre votre médicament.

- Sandoz Sertraline ne devrait pas nuire à vos activités normales. Cependant, certains patients qui prennent Sandoz Sertraline éprouvent de la somnolence; si c'est votre cas, vous ne devriez pas conduire, ni faire fonctionner des machines qui peuvent être dangereuses.
- Évitez de prendre des boissons alcoolisées durant le traitement avec Sandoz Sertraline.
- Consultez votre médecin avant d'arrêter de prendre Sandoz Sertraline ou de réduire la dose de votre médicament. À l'arrêt du traitement ou après une réduction de la dose de Sandoz Sertraline, vous pourriez ressentir certains symptômes comme des étourdissements, des rêves anormaux, une sensation de chocs électriques, de l'agitation, de l'anxiété, de la difficulté à vous concentrer, des maux de tête, des tremblements, des nausées, des vomissements, de la transpiration, ou autres. Ces symptômes peuvent également se produire quand une dose est oubliée. Ils disparaissent habituellement sans traitement. Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez un de ces symptômes ou tout autre symptôme; votre médecin pourrait ajuster la posologie de Sandoz Sertraline pour les apaiser.
- Après la commercialisation, quelques nouveau-nés dont la mère avait pris un ISRS (inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine) comme Sandoz Sertraline ou autre antidépresseur de nouvelle génération pendant la grossesse ont manifesté des complications à la naissance qui ont nécessité une hospitalisation prolongée, un soutien respiratoire et une alimentation par gavage. Les symptômes signalés étaient les suivants: difficultés à s'alimenter et/ou à respirer, convulsions, tension ou relâchement excessif des muscles, agitation et pleurs constants. Dans la plupart des cas, l'antidépresseur de nouvelle génération avait été pris pendant le troisième trimestre de la grossesse. Ces symptômes témoignent d'un effet défavorable direct sur le bébé ou peut-être d'un syndrome de retrait causé par un arrêt soudain de l'exposition au médicament. En général, ces symptômes se résorbent au fil du temps. Cela dit, si votre bébé montre n'importe lequel de ces symptômes, communiquez avec votre médecin le plus tôt possible.

Si vous êtes enceinte et prenez un ISRS ou un autre antidépresseur de nouvelle génération, vous devriez discuter avec votre médecin des risques et des avantages des diverses options de traitement qui s'offrent à vous. Il est essentiel de ne pas cesser de prendre ces médicaments avant d'en avoir parlé à votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURDOSE

Si vous avez pris beaucoup de capsules d'un seul coup, appelez tout de suite votre médecin, le service d'urgence d'un hôpital ou le centre antipoison le plus près de chez vous, même si vous ne vous sentez pas malade.

COMMENT CONSERVER SANDOZ SERTRALINE

Conservez Sandoz Sertraline dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30 °C). Gardez le contenant hermétiquement fermé. Tenez-le hors de la portée des enfants.

Si votre médecin décide d'interrompre le traitement avec Sandoz Sertraline, retournez à la pharmacie toutes les capsules qui vous restent, afin qu'elles puissent être détruites en toute sécurité. Gardez-les seulement si votre médecin vous le recommande.

CE QUE CONTIENT SANDOZ SERTRALINE

Sandoz Sertraline est offert en capsules à enveloppe dure de 25 mg (jaune), de 50 mg (jaune et blanche) et de 100 mg (orange). Le chlorhydrate de sertraline est le principe actif. Les ingrédients non médicinaux comprennent: de l'amidon de maïs, du lactose (anhydre), du stéarate de magnésium et du laurylsulfate de sodium. Les capsules mêmes se composent de gélatine, de dioxyde de titane, d'oxyde de fer et de colorant D&C jaune n° 10. De plus, les capsules de 25 et 50 mg contiennent aussi le colorant FD&C jaune n° 6 et les capsules de 100 mg contiennent en plus le colorant FD&C rouge n° 40.

QUI FABRIQUE SANDOZ SERTRALINE

Les capsules Sandoz Sertraline sont fabriquées par Pharmascience Inc.

Rappel: Ce médicament vous a été prescrit personnellement. N'en donnez pas à qui que ce soit. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

© Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.



Sandoz Canada Inc.
Oc, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com

1 800 361-3062

Révisé: mars 2006